

○ 중현메로페넴주 500밀리그램 및 1그램 허가사항 변경대비표

항목	기허가사항	변경(안)
사용상의 주의사항	<p>3. 이상반응 <기 허가사항과 동일></p> <p>9) 피부 : 다른 카바페넴계 항생물질에서 드물게 중독성 표피괴사용해(리엘 중후군), 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군)이 <u>(추가)</u> 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.</p> <p><기 허가사항과 동일></p>	<p>3. 이상반응 <기 허가사항과 동일></p> <p>9) 피부 : <<u>삭제</u>> 중독성 표피괴사용해(리엘증후군), 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군), <u>호산구증 및 전신증상을 동반한 약물반응(DRESS 증후군)</u>, <u>다형홍반, 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)</u>과 같은 중증 피부반응이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.</p> <p><기 허가사항과 동일></p>